

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2025/4/17 15:21

プロトコール名称 トレアキシン②③+リツキシマブ①初回 4w+1d

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫

診療科 内科

投薬日数 3日

休薬日数 26日

最大クール数 1クール

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2025/ 1/28

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2025/ 1/31 10:56

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0~ 25 mL/min

%

G F R 0~ 25 mL/min

%

C C r 25~ 50 mL/min

%

G F R 25~ 50 mL/min

%

C C r 50~ 75 mL/min

%

G F R 50~ 75 mL/min

%

C C r 75~100 mL/min

%

G F R 75~100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 135IU/l

以上

A L T

165IU/l

以上

T-Bil 2mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7.5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 9 g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)				
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠10mg 後)ロキソプロフェンNa錠60mg「サリイ」(ロキソ) ... 1日1回 リツキシマブ開始30分前に内服	朝						
錠 5 錠 1							
注射							
Rp 01 点滴注射 主管 フラッシュ用、ルート確保用 大塚生食注50mL	00:00	00:00	00:00				
点滴注射							
1 瓶							
Rp 02 点滴注射 30分かけて ゲテヒロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン)		00:00	00:00				
点滴注射							
1 袋 2 A							
Rp 03 点滴注射 調製後6時間以内に投与終了 10分かけて 大塚生食注50mL トレアキシン点滴静注液		00:00	00:00				
点滴注射							
調製して良いか確認すること							
1 瓶 90 mg/m ²							
注射							
Rp 04 点滴注射 注入速度徐々にUP、10倍希釈して下さ テルモ生食500mL リツキシマブ注	00:00						
点滴注射							
1 袋 375 mg/m ²							
【冷&暗保存】							
ー以下余白ー							

コメント

参考文献