



# プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2026/5/7

09:25

プロトコール名称 Pola+R-CHP 3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫  
 診療科 内科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 6クール  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2025/ 6/27 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2025/ 6/27 14:17  
 承認者 森木 康之  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 有り  
 BUN 100mg/dl 以上 Scr 1.2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り  
 AST 67.5IU/l 以上 ALT 82.5IU/l 以上  
 T-Bil 1.5mg/dl 以上

CBCの検査結果値による警告 有り  
 白血球  $30 \times 10^2 / \mu l$  以下 リンパ球 1% 以下  
 好中球  $15 \times 10^2 / \mu l$  以下 血小板  $7.5 \times 10^4 / \mu l$  以下  
 ヘモグロビン 9g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
Rp 05 点滴注射 点滴注射 ポライビー投与時間と同じ時間経過観 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 06 点滴注射 点滴注射 30分かけて 大塚生食注100mL 1 瓶 ★トキビル <sup>®</sup> シ塩酸塩注射液10mg「サド」5mL 50 mg/m <sup>2</sup> 【冷所保存】	00:00						
Rp 07 点滴注射 点滴注射 1時間かけて テルモ生食500mL 1 袋 エンドキサン注 750 mg/m <sup>2</sup>	00:00						
Rp 08 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
-以下余白-							

コメント

参考文献