

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2026/5/7

09:38

プロトコール名称 ★イリノテカン①⑧⑬ 4W A法

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2026/ 4/17 09:14
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2026/ 4/17	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 135IU/l	以上	ALT 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注 100mL 1 瓶	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて 側管① ★デキサート注射液▲6. 6mg/2mL (テカトロン) 1 瓶 ★デキサート注射液▼1.65mg(0.5mL) (テカトロン) 1 A パロヒトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイク」 1 袋	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて 側管② テルモ生食 500mL 1 袋 イリノテカン注 100 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2026/5/7

09:38

プロトコール名称 ★イリノテカン①⑧⑬ 4W A法

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2026/ 4/17 09:14
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2026/ 4/17	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 135IU/l	以上	ALT 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 30×10 ² /μl	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 15×10 ² /μl	以下	血小板 10×10 ⁴ /μl	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注100mL 皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 30分かけて ★デキサート注射液▲6. 6mg/2mL(テカト [®] ソ) ★デキサート注射液▼1.65mg(0.5mL)(テカト [®] ソ) パロヒト [®] 点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイク」 皮下埋込型一般注射液 側管① 1 瓶 1 A 1 袋	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 90分かけて テルモ生食500mL イリノテカン注 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 側管② 1 袋 100 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2026/5/7

09:38

プロトコール名称 ★イリノテカン①⑧⑬ 4W A法

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2026/ 4/17 09:14
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2026/ 4/17	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN	100mg/dl	以上	Scr
			2.4mg/dl
			以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST	135IU/l	以上	ALT
T-Bil	2mg/dl	以上	165IU/l
			以上

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球	$30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球
好中球	$15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板
ヘモグロビン	8g/dL	以下	1%
			$10 \times 10^4 / \mu l$
			以下

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注100mL	00:00						
皮下埋込型一般注射液 1 瓶							
Rp 02 中心静脈注射 30分かけて ★デキサート注射液▲6. 6mg/2mL(テカト [®] ソ) ★デキサート注射液▼1.65mg(0.5mL)(テカト [®] ソ) パロヒト [®] 点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイク」	00:00						
皮下埋込型一般注射液 側管① 1 瓶 A 1 袋							
Rp 03 中心静脈注射 90分かけて テルモ生食500mL イリノテカン注	00:00						
皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 側管② 1 袋 100 mg/m ²							
—以下余白—							

コメント

参考文献