プロトコールマスター内容

発行日時 2026/5/7 09:24

プロトコール名称 リツキシマブ① 3W (Pola+R-CHP後)

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
診療科 内科
投薬日数 1日
休薬日数 20日
最大クール数 2クール
心機能の確認 必須
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2025/ 6/20 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2025/ 6/20 17:00
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 mL/min	%		ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%	
ＣＣｒ 25～ 50 mL/min	%		ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%	
ＣＣｒ 50～ 75 mL/min	%		ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%	
ＣＣｒ 75～100 mL/min	%		ＧＦＲ 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 有り

ＢＵＮ	100mg/dl	以上	Ｓｃｒ	1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

ＡＳＴ	67.5IU/l	以上	ＡＬＴ	82.5IU/l	以上
T-Bil	1.5mg/dl	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

白血球	30×10^2/μl	以下	リンパ球	1%	以下
好中球	15×10^2/μl	以下	血小板	7.5×10^4/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	9g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

			day(1)						
処方（前投薬） 院内									
Rp 01 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 後)ロキソプロフェンNa錠60mg「ｻﾜｲ」(ﾛｷｿﾆﾝ) ．．1日1回 開始３０分前までに内服	5 1	錠 錠	朝						
注射									
Rp 01 点滴注射 注入速度徐々にUP テルモ生食５００ｍＬ 10倍稀釈して下さい リツキシマブ注	点滴注射 前投与薬注意 1 375	 袋 mg/㎡ 【冷＆暗保存】	00:00						
Rp 02 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注５０ｍＬ	点滴注射 1	 瓶	00:00						
		ー以下余白ー							

コメント

参考文献