

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2026/5/7

09:35

プロトコール名称 リツキシマブ① 3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
 診療科 内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2025/ 9/19 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2025/ 9/19 11:12
 承認者 森木 康之
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 有り
 BUN 100mg/dl 以上 Scr 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
 AST 54IU/l 以上 ALT 66IU/l 以上
 T-Bil 1.5mg/dl 以上

CBCの検査結果値による警告 有り
 白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
 好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$ 以下 血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
 ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 10mg 5 錠 後)ロキソプロフェンNa錠60mg「サリイ」(ロキソ) 1 錠 ... 1日1回 開始30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 注入速度徐々にUP 前投与薬注意 テルモ生食500mL 1 袋 10倍希釈して下さい リツキシマブ注 375 mg/m ² 【冷&暗保存】	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
		一以下余白一					

コメント

参考文献